

Gilvydis Vein Clinic

Consentimiento Informado Para Escleroterapia Líquida Y Con Espuma

La escleroterapia es un método muy popular para eliminar las arañas vasculares en el que se inyecta una solución, llamada agente esclerosante, en las venas. Esto provoca una irritación en el revestimiento interno de la vena que da como resultado el cierre de la vena. Se usa una aguja de calibre pequeño para realizar las inyecciones y la mayoría de los pacientes relacionan la incomodidad a una picadura de hormiga. La mayoría de las personas que se realizan la escleroterapia tienen resultados satisfactorios. Desafortunadamente, no hay garantía de que la escleroterapia sea efectiva para usted. En casos raros, la condición puede empeorar después del tratamiento con escleroterapia. El número de tratamientos necesarios difiere de un paciente a otro, dependiendo de la extensión del problema.

Riesgos Potenciales Y Efectos Secundarios:

- **Efectos secundarios más comunes:** las venas pueden estar sensibles al tacto después del tratamiento y una sensación incómoda puede correr a lo largo de la ruta de la vena. Este malestar suele ser temporal. Los moretones son muy comunes y de esperar. Algunos pacientes se quejan de una sensación de picazón después del tratamiento, que también es muy normal. La sangre atrapada puede causar una decoloración, que se puede exprimir, aunque esto puede dejar hiperpigmentación hasta uno año.
- **Hiperpigmentación transitoria:** después de la escleroterapia, puede notar algunos decoloración (rayas oscuras) después del tratamiento. Esto ocurre cuando la sangre llega atrapado dentro de la vena después de que se cierra. Por lo general, podemos expresar la sangre atrapada en su próxima visita. Si el lavado no alivia la decoloración se desvanecerá por sí solo en 4 a 12 meses. En raras ocasiones esto el oscurecimiento de la piel puede persistir durante años.
- **Ulceración de la piel:** en casos raros, se puede formar una ampolla, abrirse y volverse ulcerado La curación se produce lentamente durante unos meses. Después de la curación, esto suele dejar una cicatriz.
- **Reacción alérgica:** Muy raramente, un paciente puede tener una reacción alérgica al agente esclerosante. El riesgo de esto es mayor en pacientes que tienen antecedentes de alergias
- **Efectos secundarios raros:** inyección arterial que puede causar molestias, cicatrices en la piel, lesiones en los músculos, nervios u otros tejidos, o pérdida de una extremidad. Los eventos neurológicos también pueden ocurrir más comúnmente en personas con antecedentes de migrañas o un corazón sintomático conocido de derecha a izquierda derivación (agujero oval permeable). Los efectos secundarios neurológicos pueden incluir trastornos visuales y del habla temporales, dolores de cabeza y isquemia transitoria ataque (AIT). Ha habido casos raros de un accidente cerebrovascular (ACV) reportados en la literatura. La trombosis venosa profunda también se ha informado raramente en la literatura. Los peligros de la trombosis incluyen la posibilidad de embolia pulmonar (un coágulo de sangre llevado a los pulmones) y posflebítico síndrome, lo que resulta en una hinchazón permanente de la pierna.

Tratamientos Alternativos:

Las venas varicosas y las arañas vasculares no son condiciones potencialmente mortales, el tratamiento no es obligatorio. Algunos pacientes obtienen un alivio adecuado de los síntomas al usar medias de apoyo graduadas. La otra opción es no recibir ningún tratamiento.

Resultados Del Tratamiento Propuesto

La práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta y, por lo tanto, los profesionales acreditados no pueden garantizar los resultados. Si bien la abrumadora cantidad de pacientes ha notado resultados gratificantes de la escleroterapia, no podemos prometer ni garantizar ningún resultado específico.

Fotografía:

Acepto No doy mi consentimiento para que se utilicen fotografías y otros materiales gráficos y audiovisuales antes, durante y después del curso de mi tratamiento con fines médicos, de marketing y educativos. Aunque las fotografías o el material que las acompaña no contendrán mi nombre ni ninguna otra información de identificación, soy consciente de que las fotografías pueden o no identificarme.

Consentimiento informado:

Al firmar a continuación, reconozco que he leído la información anterior y comprendo los riesgos de la escleroterapia, los métodos alternativos de tratamiento y los riesgos de no tratar mi afección. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y creo que tengo suficiente información para dar mi consentimiento para el tratamiento.

Firma Del Paciente: _____ Fecha: _____

Nombre Impreso Del Paciente: _____

Firma del Médico: _____ Fecha: _____

Firma de Testigo: _____ Fecha: _____